

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και c σταθερός πραγματικός αριθμός, να αποδείξετε με τη χρήση του ορισμού της παραγώγου ότι

$$(cf(x))' = cf'(x), \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Μονάδες 7

A2. Πότε μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της;

Μονάδες 4

A3. Πότε μια ποσοτική μεταβλητή λέγεται διακριτή και πότε συνεχής;

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α) Αν για τη συνάρτηση f ισχύει $f'(x_0) = 0$, για $x_0 \in (a, b)$, και η παράγωγος της f' διατηρεί πρόσημο εκατέρωθεν του x_0 , τότε η f είναι γνησίως μονότονη στο (a, b) και δεν παρουσιάζει ακρότατο στο διάστημα αυτό.

(μονάδες 2)

β) Για δύο οποιαδήποτε ενδεχόμενα A, B ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει:

$$P(A - B) = P(B) - P(A \cap B)$$

(μονάδες 2)

γ) Σε μια κανονική ή περίπου κανονική κατανομή το 95% περίπου των παρατηρήσεων βρίσκονται στο διάστημα $(\bar{x} - s, \bar{x} + s)$, όπου $\bar{x}$ η μέση τιμή και s η τυπική απόκλιση των παρατηρήσεων.

(μονάδες 2)

δ) Αν x_i είναι τιμή μιας ποσοτικής μεταβλητής X , τότε η αθροιστική συχνότητα N_i εκφράζει το πλήθος των παρατηρήσεων που είναι μεγαλύτερες της τιμής x_i .

(μονάδες 2)


ε) Το κυκλικό διάγραμμα είναι ένας κυκλικός δίσκος χωρισμένος σε κυκλικούς τομείς, τα εμβαδά ή, ισοδύναμα, τα τόξα των οποίων είναι ανάλογα προς τις αντίστοιχες συχνότητες n_i ή τις σχετικές συχνότητες f_i των τιμών x_i της μεταβλητής.

(μονάδες 2)

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το ιστόγραμμα συχνοτήτων, το οποίο παριστάνει τις πωλήσεις σε χιλιάδες ευρώ που έγιναν από τους πωλητές μιας εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός έτους.



B1. Να βρείτε το πλήθος των πωλητών της εταιρείας.

Μονάδες 5

B2. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων της κατανομής των πωλήσεων κατάλληλα συμπληρωμένο, δικαιολογώντας τη στήλη με τις σχετικές συχνότητες f_i , $i=1, 2, 3, 4$

Κλάσεις	Κεντρικές τιμές x_i	Συχνότητα v_i	Σχετική συχνότητα f_i
$[-, \cdot)$			
$[-, \cdot)$			
$[-, \cdot)$			
$[-, \cdot)$			
Σύνολο			

Μονάδες 8

B3. α) Να υπολογίσετε τη μέση τιμή των πωλήσεων του έτους.

(μονάδες 6)

β) Να βρείτε το πλήθος των πωλητών που έκαναν πωλήσεις τουλάχιστον 4,5 χιλιάδων ευρώ (θεωρούμε ότι οι παρατηρήσεις κάθε κλάσης είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες)

(μονάδες 6)

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Γ

Ένα δοχείο περιέχει κόκκινες (Κ), άσπρες (Α) και πράσινες (Π) μπάλες. Επιλέγουμε τυχαία μία μπάλα. Η πιθανότητα να προκύψει κόκκινη μπάλα είναι $P(K)=x_1$, ενώ η πιθανότητα να προκύψει άσπρη μπάλα είναι $P(A)=x_2$, όπου x_1, x_2 είναι οι θέσεις των τοπικών ακροτάτων της συνάρτησης

$$f(x) = 4x^3 - \frac{7}{2}x^2 + x - 1, \quad x \in \mathbb{R} \quad \text{με } x_1 < x_2$$

Γ1. Να βρείτε τις πιθανότητες $P(K)$, $P(A)$ και $P(\Pi)$, όπου $P(\Pi)$ η πιθανότητα να προκύψει πράσινη μπάλα.

Μονάδες 10

Γ2. Αν $P(K) = \frac{1}{4}$ και $P(A) = \frac{1}{3}$, να βρείτε τις πιθανότητες των παρακάτω ενδεχομένων:

Γ: «η μπάλα που επιλέγεται τυχαία να είναι κόκκινη ή άσπρη»

Δ: «η μπάλα που επιλέγεται τυχαία να είναι ούτε κόκκινη ούτε άσπρη»

Ε: «η μπάλα που επιλέγεται τυχαία να είναι άσπρη ή να μην είναι πράσινη».


Μονάδες 8

Γ3. Αν οι άσπρες μπάλες είναι κατά τέσσερις (4) λιγότερες από τις πράσινες μπάλες, να βρείτε πόσες μπάλες έχει το δοχείο.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ

Θεωρούμε ένα κουτί σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με βάση ορθογώνιο και **ανοικτό από πάνω**.



Το ύψος του κουτιού είναι 5dm. Η βάση του κουτιού έχει σταθερή περίμετρο 20dm και μία πλευρά της είναι x dm με $0 < x < 10$

Δ1. Να αποδείξετε ότι η συνολική επιφάνεια του κουτιού ως συνάρτηση του x είναι

$E(x) = -x^2 + 10x + 100$, $x \in (0, 10)$ και να βρείτε για ποια τιμή του x το κουτί έχει μέγιστη επιφάνεια.

Μονάδες 8

Στη συνέχεια θεωρούμε τα σημεία $A_i(x_i, y_i)$, όπου $y_i = E(x_i)$, $i=1, 2, \dots, 15$ με $5 = x_1 < x_2 < \dots < x_{14} < x_{15} = 9$

Δ2. Αν το δείγμα των τετμημένων x_i , $i=1, 2, \dots, 15$ των παραπάνω σημείων $A_i(x_i, y_i)$

- δεν είναι ομοιογενές
- έχει μέση τιμή $\bar{X} = 8$ και
- τυπική απόκλιση s τέτοια, ώστε $2s^2 - 5s + 2 = 0$

τότε:

α) να αποδείξετε ότι $s=2$

(μονάδες 4)

β) να βρείτε τη μέση τιμή των x_i^2 , με $i=1, 2, \dots, 15$

$$s^2 = \frac{1}{v} \sum_{i=1}^v t_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^v t_i \right)^2}{v}$$

Δίνεται ότι:

(μονάδες 4)

Μονάδες 8

Δ3. Επιλέγουμε τυχαία ένα από τα παραπάνω σημεία $A(x_i, y_i)$, $i=1, 2, \dots, 15$. Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου:

$B = \{A(x_i, y_i), i=1, 2, \dots, 15 \text{ τέτοια, ώστε } y_i > -4x_i + 9R + 1\}$, όπου R είναι το εύρος των $y_i = E(x_i)$, $i=1, 2, \dots, 15$

Μονάδες 9

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Θεωρία σχολικού βιβλίου σελίδα 30

A2. Θεωρία σχολικού Βιβλίου σελίδα 13

A3. Θεωρία σχολικού Βιβλίου σελίδα 59

A4. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό

ΘΕΜΑ Β

B1. $n = n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = 12 + 8 + 14 + 6 = 40$

B2.

Κλάσεις	Κεντρικές Τιμές x_i	Συχνότητα v_i	Σχετική Συχνότητα f_i	$x_i v_i$
[2,4)	3	12	0,30	36
[4,6)	5	8	0,20	40
[6,8)	7	14	0,35	98
[8,10)	9	6	0,15	54
Σύνολο		40	1	228

$$f_1 = \frac{v_1}{n} = \frac{12}{40} = 0,30 \quad f_2 = \frac{v_2}{n} = \frac{8}{40} = 0,20$$

$$f_3 = \frac{v_3}{n} = \frac{14}{40} = 0,35 \quad f_4 = \frac{v_4}{n} = \frac{6}{40} = 0,15$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^4 x_i v_i}{n} = \frac{228}{40} = 5,7$$

B3. α) χιλ. ευρώ.

B) Το πλήθος των πωλητών με πωλήσεις τουλάχιστον 4,5 χιλιάδων ευρώ

$$\frac{3}{4} \cdot 8 + 14 + 6 = 26$$

είναι

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. $f(x) = 12x^2 - 14x + 1, x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow 12x^2 - 14x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{4} \quad \text{ή} \quad x = \frac{1}{3}$$

Το πρόσημο της f' φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	○	○	+
$f(x)$	Γνησίως αύξουσα	Γνησίως φθίνουσα	Γνησίως αύξουσα	

Στο $x_1 = \frac{1}{4}$ η f παρουσιάζει τ.μέγιστο και στο $x_2 = \frac{1}{3}$ η f παρουσιάζει τ.ελάχιστο.

$$P(K) = \frac{1}{4}, P(A) = \frac{1}{3}$$

Άρα

$$P(P) = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$$

$$R(G) = R(K \cup A) = R(K) + R(A) = \frac{7}{12}$$

Γ2.

$$R(D) = P(P) = \frac{5}{12}$$

$$R(A \cup P \phi) = R(A) + P(P \phi) - R(A \cap P \phi) = P(A) + 1 - P(P) - P(A) = 1 - P(P) = \frac{7}{12}$$

Γ3. Έστω x οι πράσινες και $x - 4$ οι άσπρες και v όλες οι μπάλες

$$R(A) = \frac{x-4}{v} \Leftrightarrow \frac{1}{3} = \frac{x-4}{v} \Leftrightarrow x = \frac{v+12}{3}$$

$$P(P) = \frac{x}{v} \Leftrightarrow \frac{5}{12} = \frac{x}{v} \Leftrightarrow x = \frac{5v}{12}$$

$$\frac{v+12}{3} = \frac{5v}{12} \Leftrightarrow 12v+144=15v \Leftrightarrow 3v=144 \Leftrightarrow v = \frac{144}{3} = 48$$

Άρα

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Αν y dm η άλλη διάσταση της βάσης τότε:

$$2x + 2y = 20, \text{ οπότε } y = 10 - x$$

$$E(x) = x(10-x) + 2 \cdot 5(10-x) + 2 \cdot 5x = -x^2 + 10x + 100, x \in (0,10)$$

$$E'(x) = -2x + 10, x \in (0,10)$$

x	0	5	10
E'(x)	+		○
E(x)	Γνησίως αύξουσα		Γνησίως φθίνουσα

Ολικό μέγιστο

Για $x = 5$ dm το κουτί έχει την μέγιστη επιφάνεια

Δ2. Αφού το δείγμα δεν είναι ομοιογενές τότε:

$$CV > \frac{1}{10} \Leftrightarrow \frac{s}{\bar{x}} > \frac{1}{10} \Leftrightarrow \frac{s}{8} > \frac{1}{10} \Leftrightarrow s > 0,8$$

$$\text{Έχουμε } 2s^2 - 5s + 2 = 0 \Leftrightarrow s = 2 \quad \text{ή} \quad s = \frac{1}{2} \quad (\text{απορρίπτεται})$$

Άρα $s = 2$

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^2 - \left(\frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n} \right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^2 - \left(\frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n} \right)^2 = \bar{x}^2 - (\bar{x})^2$$

β)

$$\text{Άρα } \bar{x}^2 = s^2 + (\bar{x})^2 = 2^2 + 8^2 = 68$$

Δ3. Επειδή η E γνησίως φθίνουσα στο $[5, 10)$ και αφού $x_1 < x_{15}$ τότε $E(x_1) > E(x_{15})$ οπότε $R = E(x_1) - E(x_{15}) = E(5) - E(9) = 125 - 109 = 16$

$$\text{Έχουμε } y_i > -4x_i + 9R + 1 \Leftrightarrow -x_i^2 + 10x_i + 100 > -4x_i + 9 \cdot 16 + 1 \Leftrightarrow -x_i^2 + 14x_i - 45 > 0 \Leftrightarrow 5 < x_i < 9, i = 2, \dots, 14$$

$$\text{Οπότε } B = \{A(x_i, y_i), i = 2, 3, \dots, 14\}$$

$$P(B) = \frac{N(B)}{N(\Omega)} = \frac{13}{15}$$

ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
«ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΥΣΗΣ Π. – ΣΙΦΝΑΙΟΣ Δ. – ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ Ι. – ΦΙΛΙΟΓΛΟΥ Ε. –
ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.